

OCD Check

Hoe belangrijk is het voorkomen van beengebreeken voor u?

Beantwoord onderstaande vragen, voor de berekening van uw score en de uitkomst, kijk op de achterkant van deze check.



Podo

1-2-3 van Pavo met Podo!

Wist u dat alleen Pavo het beproefde Podo concept in haar fokkerij assortiment heeft?

De opfokperiode begint zo'n 3 maanden voor de geboorte, en duurt tot een leeftijd van 30 maanden.

De Breeders-lijn van Pavo is niet alleen optimaal afgestemd op de behoefte van uw merrie en veulen, maar is speciaal gemaakt voor deze hele periode.

1



Pavo Podo Lac

voor de merrie en haar ongeboren veulen

2



Pavo Podo Start

voor het veulen tot 8 maanden

3



Pavo Podo Grow

voor het opgroeiende paard tot 30 maanden.

Dus laat uw veulen geen dag alleen in deze belangrijke periode en voer de Pavo Breeders producten

- Hoe oud is uw merrie?**
 - 3 – 12 jaar
 - 12 – 15 jaar
 - ouder dan 15 jaar
- Hoe veel veulens heeft uw merrie al gekregen?**
 - 1 – 3 veulens
 - 4 – 5 veulens
 - meer dan 5 veulens
- Heeft u ooit wel eens een veulen met OC(D) gefokt van deze merrie?**
 - nee nog nooit
 - weet ik niet
 - een (of meer) veulen(s) heeft OC of OCD
- Heeft uw merrie zelf OC of OCD?**
 - nee zeker niet
 - geen idee, ze is nooit op de foto geweest
 - de merrie heeft een bemerking voor OC(D)
- Komen uw merrie en veulen dagelijks buiten?**
 - Ja, merrie en veulen lopen iedere dag minimaal 8 uur in de wei
 - Ja, overdag lopen ze een paar uurtjes in de paddock
 - Nee, door omstandigheden staan ze de hele dag op stal
- Waar verblijft het veulen in de winter na het spenen?**
 - in groepshuisvesting
 - samen met een ander veulen in een grote box
 - apart gehuisvest in een box
- Heeft uw veulen ook in de winter de mogelijkheid om te bewegen?**
 - ja, een grote loopstal met uitloop / in de winter komt mijn veulen iedere dag zo'n 8 uur buiten
 - ja, overdag een paar uurtjes (2 tot 7 uur)
 - niet tot maximaal een uurtje per dag
- Welk krachtvoer geeft u de merrie in de laatste drie maanden van de dracht?**
 - merriebrok van Pavo
 - merriebrok van een ander merk
 - standaardbrokken
- Wanneer start u met het voeren van krachtvoer aan uw veulen?**
 - ik start met Pavo Podo Start (voorheen veulenopfokkorrel) tussen de 1 en 3 maanden
 - Ik start met veulenbrokken van een ander merk ergens tussen de 1 en 3 maanden
 - rondom het spenen begin ik met bijvoeren
- Tot welke leeftijd voert u uw veulen speciale veulenbrok?**
 - tot de leeftijd van 2,5 jaar
 - tot ongeveer 1 jaar
 - ik voer geen veulenbrok
- Welk ruwvoer krijgen uw merrie en veulen?**
 - hooi/voordroogkuil waarvan ik de gehaltes ken
 - hooi/voordroogkuil waarvan ik niet precies weet wat er in zit
 - hooi van natuurland
- Op wat voor grondsoort ligt uw weide?**
 - klei / löss
 - veen
 - zand
- Wordt de weide waar uw merrie en veulen lopen jaarlijks bemest?**
 - ja, met drijfmest
 - ja, met kunstmest (NPK)
 - nee, de paardenweide wordt niet jaarlijks bemest
- Hoe is de conditie van uw veulen na het spenen?**
 - schrle conditie
 - normale conditie
 - rijke conditie

www.pavo.net



OCD Check



Resultaat:

Aantal antwoorden "a.": x 0 punten =
Aantal antwoorden "b.": x 1 punt =
Aantal antwoorden "c.": x 3 punten =
Totaal aantal punten =

0 – 5 punten

Gefeliciteerd, u doet er alles aan om het ontstaan van beengebreeken te voorkomen. Er is geen garantie maar u beperkt de risico's maximaal door aandacht te besteden aan de drie factoren erfelijkheid, beweging en voeding.

6 – 10 punten

U loopt enig risico op ontwikkeling van beengebreeken. Het valt niet mee om alle factoren die van invloed zijn te controleren maar op een aantal punten is er verbetering mogelijk.

Meer dan 10 punten

U kunt nog een aantal maatregelen nemen om het risico op beengebreeken bij uw veulen te beperken. Voldoende beweging en het Pavo Breeders assortiment gedurende de gehele opfokperiode van -3 maanden tot 2,5 jaar helpt om uw veulen evenwichtig te laten opgroeien met alles wat hij nodig heeft.

✓ **Bloedonderzoek naar mineralenbalans**

In het bloed van uw merrie is te zien of de mineralen (zoals calcium, fosfor en magnesium) en sporenelementen (als koper en zink) goed in balans zijn. Alleen via Pavo kunt u voor ongeveer 50 euro zo'n onderzoek laten uitvoeren door de GD. Kijk voor meer info op www.pavo.net

✓ **Bodemonderzoek en bemestingsadvies**

Als u door het BLGG in Oosterbeek een grondmonster laat onderzoeken (kosten omstreeks 60 euro) dan kunt u de uitslag naar Pavo sturen. U ontvangt dan van ons geheel vrijblijvend een bemestingsadvies voor uw paardenweide. Kijk voor meer informatie op www.pavo.net

✓ **Onderzoek uw eigen ruwvoer**

U kunt bovenstaande onderzoeken ook in combinatie met een onderzoek van uw eigen ruwvoer laten uitvoeren. Kijk voor meer info op www.pavo.net

Toelichting bij de vragen:

- Hoe oud is uw merrie?**
Vanaf zo'n 15 jaar komt de merrie in de middelbare leeftijd en verandert haar stofwisseling. Opname en benutting van mineralen wordt minder goed en de voeding van vooral drachtige en lacterende merries heeft daarom extra aandacht nodig.
- Hoe veel veulens heeft uw merrie al gekregen?**
Als een merrie een veulen draagt en zoogt "geeft ze veel van zichzelf weg". Naderhand wordt de voorraad wel weer aangevuld maar niet tot 100%. Na 5 veulens is extra aandacht voor de mineralenvoorziening nodig.
- Heeft u ooit wel eens een veulen met OC(D) gefokt van deze merrie?**
Als er één of meer veulens of zelfs bij de merrie zelf OC(D) is vastgesteld, dan is het belangrijk om extra attent te zijn. De invloed van erfelijkheid is zo'n 25%. Dat is veel, maar het betekent ook dat ongeveer 60% wordt bepaald door voeding en beweging. Dat biedt u volop mogelijkheden om het risico op beengebreeken te verkleinen.
- Heeft uw merrie zelf OC of OCD?**
Voor deze vraag geldt hetzelfde als voor vraag 3. Natuurlijk heeft de hengst ook invloed op erfelijke aanleg. In deze test gaan we ervan uit dat u fokt met een OCD-vrije hengst.
- Komen uw merrie en veulen dagelijks buiten?**
Veel beweging is essentieel om OC(D) te voorkomen, alleen bij voldoende beweging ontwikkelen botten zich zoals het hoort.
- Waar verblijft het veulen in de winter na het spenen?**
Huisvest veulens bij voorkeur in groepen en geef ze volop uitloop. Zorg voor een afwisselende bodem: dus harde en zachte bodem afwisselen. Een veulen alleen zal ook in de wei veel minder bewegen dan wanneer hij een maatje heeft om mee te stoeien.
- Heeft uw veulen ook in de winter de mogelijkheid om te bewegen?**
Voor deze vraag geldt hetzelfde als voor vraag 6.
- Welk krachtvoer geeft u de merrie in de laatste drie maanden van de dracht?**
Al voor de geboorte slaat het veulen belangrijke mineralen en sporenelementen op voor de aanmaak van botweefsel.
- Wanneer start u met het voeren van krachtvoer aan uw veulen?**
Merriemelk bevat onvoldoende "minerale" bouwstenen voor het snel groeiende veulen.
- Tot welke leeftijd voert u uw veulen speciale veulenbrok?**
De botontwikkeling duurt tot een leeftijd van zo'n 30 maanden. Tot die tijd is ondersteuning met Podo Grow belangrijk.
- Welk ruwvoer krijgen uw merrie en veulen?**
De populariteit van natuurhooi is erg hoog, maar er kleven ook bezwaren aan. Je weet niet precies wat je voert en meestal is de mineralenbalans niet goed. Door het lage eiwitgehalte is het minder geschikt voor de merrie en haar veulen.
- Op wat voor grondsoort ligt uw weide?**
Zandbodems versralen over het algemeen sneller dan bijvoorbeeld kleibodems. Bij een lage bemestingsgraad van de paardenweide is er op zand een groter risico op mineralentekorten en daarmee ontwikkeling van beengebreeken.
- Wordt de weide waar uw merrie en veulen lopen jaarlijks bemest?**
Wij adviseren uw weide zo'n eens in de 5 jaar te bemonsteren. Dan weet u welke tekorten er zijn en kunt u deze met organische mest en/of kunstmest van Pavo aanvullen. Bemesting dient om de mineralenvoorziening in de bodem op peil te houden.
- Hoe is de conditie van uw veulen na het spenen?**
Een "schraal" veulen is een goed veulen. Veulens met een te rijke conditie groeien te snel en krijgen daardoor vaak problemen.

www.pavo.net

